



GARDENTOP® GB

RODENTICÍDNY PRÍPRAVOK VO FORME PELIET



Obrázok slúži len na ilustračné účely.

BROMADIOLÓN 0,005%

GARDENTOP® GB - Rodenticídna návnada vo forme peliet k priamemu použitiu (Typ výrobku 14)

Zloženie: Bromadiolón (CAS číslo 28772-56-7, ES číslo 249-205-9) 0,005% (= 50 mg/kg⁻¹)

Výstražné upozornenia:

H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa - H372 Spôsobuje poškodenie krvi pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia:

P260 Nevdychujte prach - P280 Noste ochranné rukavice - P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite - P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi - P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia - P308+P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhladať lekársku pomoc / starostlivosť - P405 Uchovávať uzamknuté - P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.



NEBEZPEČENSTVO

Číslo autorizácie: 2011/4089/10306/SK/MA/19935

Držiteľ autorizácie / Dodávateľ: **ZAPI S.p.A.**

Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) Taliansko Tel. +390499597737

LEN NA ODBORNÉ POUŽITIE

Požerová návnada vo forme červených peliet určená k profesionálnemu hubeniu škodlivých hlodavcov ako je potkan (*Rattus norvegicus*) alebo myš domáca (*Mus musculus*) v bytových i nebytových priestoroch, pivniciach, poválach, potravinárskych a poľnohospodárskych prevádzkach, chovoch hospodárskych zvierat a.i.

Spôsob použitia

Z dôvodu prevedenia dokonalej deratizácie sa držte nasledujúcich pokynov:

1/ Posúdenie lokality

Pred zahájením vlastnej deratizácie vykonajte dokonalú prehliadku oblasti so zameraním na druhové určenie hlodavcov, úroveň i intenzitu zamorenia. Skontrolujte možné prístupové cesty, odstráňte všetky zdroje vody a potravy. S ohľadom na prítomnosť čerstvého trusu a ďalších stôp pohybu hlodavcov špecifikujte najvhodnejšie miesta pokládky návnady.

V prípade, že chcete minimalizovať použitie rodenticídnych návnad (napr. pri eliminácii hlodavcov v potravinárskych prevádzkach alebo v chovoch zvierat), odporúčame preferovať netoxické návnady.

2/ Aplikácia

Návnadu kladíme do miest, kde je viditeľná činnosť hlodavcov (čerstvý trus, zvyšky potravy, v blízkosti alebo vo vnútri nôr a pod.) pomocou komerčne dostupných deratizačných staničiek. Ak nemáme deratizačné staničky k dispozícii, odporúčame z dôvodov ochrany necielových organizmov (domáce zvieratá, vtáky, príp. malé deti) a ochrany pred vlhkosťou použiť aspoň napr. kúsky drenážneho potrubia alebo papierové tácky či iné podložky. Z dôvodu nutnosti prekrytia ľudského pachu je vhodné pri manipulácii s návnadou použiť gumové alebo PVC rukavice.

Prípravok je vyrábaný vo forme: - voľná návnada nadávkovaná vo vreckách.

Čas potrebný na biocidny účinok: 3-5 dní.

Aplikačná dávka:

V prípade myši: Kladieme v množstve až 50g návnady na jedno miesto. Vzdialenosť jednotlivých miest pokládky návnady sa pohybuje od 5 metrov (optimálna vzdialenosť) do 2 metrov (vysoký stupeň zamorenia).

V prípade potkanov: Kladieme v množstve až 100g návnady na jedno miesto. Vzdialenosť jednotlivých miest pokládky návnady sa pohybuje od 10 metrov (optimálna vzdialenosť) do 5 metrov (vysoký stupeň zamorenia).

3/ Monitoring

Starú (znečistenú, ohryzenú) návnadu je nutné priebežne nahrádzať novou (odporúčame vykonávať kontrolu každé 2 týždne). V prípade, že niektoré návnadové miesta zostávajú nedotknuté, odporúčame zmeniť ich umiestenie. Ak nachádzame uhybnuté hlodavce, je nutné ich zozbierať a zlikvidovať podľa predpisov. Vždy dbajte na znemožnenie prístupu necielových zvierat, príp. aj detí.

4/ Ukončenie deratizácie

Ak už nedochádza k úbytku návnady, je možné považovať deratizáciu za ukončenú. Nespotrebované zvyšky návnady je treba odstrániť. Aby sa obmedzilo riziko návratu hlodavcov, je nutné udržiavať všetky miesta v čistote a bez zvyškov potravy.

Pozor! Prípravok nesmie byť použitý inak ako je uvedené v návode na použitie! Nedávajte na miesta, kde by bol dosiahnuteľný pre domáce alebo hospodárske zvieratá! Nesmie byť použitý vo voľnej prírode!

Vlastnosti a mechanizmus účinku

GARDENTOP® patrí medzi antikoagulanty druhej generácie založené na účinnej látke bromadiolón. Pre cieľového jedinca je smrteľná jediná dávka. Znižuje zrážanlivosť krvi, čo vedie k vonkajšiemu a vnútornému krvácaniu a následne k uhytnutiu. Cieľové zvieratá sú prilákané ochucovadlami obsiahnutými v návnade a hynú počas troch až piatich dní po konzumácii bez výrazných klinických príznakov, ktoré by vyvolali podozrenie u ostatných členov kolónie.

GARDENTOP® obsahuje horké ochucovadlo (denatónium benzoát), ktoré výrazne znižuje riziko konzumácie deťmi.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Noste vhodné ochranné rukavice a ochranu dýchacieho ústrojenstva (respirátor s výdychovým ventilom EN149:2001, FFP2 alebo ekvivalentný). Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Po práci si umyte nezakryté časti tela vodou a mydlom. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.



0675730LAS.04R

© ZAPI S.p.A. • info@zapispa.com • www.zapispa.com

Ak je prípravok používaný vo verejných priestoroch, je nutné ošetrené plochy výrazne označiť informáciou o použití antikoagulačných rodenticídov.

Prvá pomoc

Po požití - vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Starostlivo vypláchnuť ústa vodou. Lekárovi odovzdať obal od prípravku, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov. Nevyvolávať zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí.

Pri kontakte s pokožkou - zasiahnuté miesto dôkladne umyť mydlom a vodou.

Pri nadýchaní - postihnutého dopraviť na čerstvý vzduch. Pokiaľ sa postihnutý necíti dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí očí - vyplachovať najmenej 15 minút čistou vodou i pod viečkami.

Príznaky otravy: Bromadiolón je nepriamy antikoagulant, pôsobí ako inhibitor vitamínu K1, vyvoláva krvácanie z nosa a dasien, tvorbu zrazenín v koži, podkoží a na slizniciach, celkovú slabosť, prípadne šok. K tvorbe zrazenín môže dôjsť až niekoľko dní po konzumácii.

Informácia pre lekára: V prípade konzumácie väčšieho množstva produktu sa odporúča vyvolať zvracanie, výplach žaludku a kontrola aktivity protrombínu nie menej ako 18 hodín po požití. V prípade vyšších hodnôt sa odporúča podať vitamín K1. Antikoagulanty sú kontraindikované. Špecifický protijed: Vitamín K1 (Kanavit).

V prípade potreby kontaktovať príslušné toxikologické informačné centrum: Národné informačné toxikologické centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. číslo : 02-547 74 166.

Skladovanie

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v suchu mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Uchovávať na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Uchovávať mimo dosahu detí.

Likvidácia obalov a zvyškov

Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akýkoľvek účel! Prázdne obaly môžu byť odoslané na skládku alebo na recykláciu až po vyčistení, ak sa koná v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

Zvyšky prípravku musia byť likvidované podľa zákona. Odpad zatriedte podľa katalógu odpadov. Zabráňte kontaminácii povrchových i podzemných vôd ako samotným prípravkom, tak i vyprázdnenými obalmi. Zabráňte kontaminácii potravín, nápojov a krmív.

Doba použiteľnosti

Pri správnom spôsobe skladovania v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu výroby

Dátum výroby a číslo šarže:

Výrobca prípravku: ZAPI S.p.A. Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD), Taliansko, telefón +39/049/9597737

Gardentop® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Zapi

Distribútor: EKOLAS SK, s.r.o.

Paderovce, Poľná 11/2, 919 30 Jaslovské Bohunice, Slovenská Republika, Tel.: +421 33 5592096

Balenie: **25 kg**