· měkká návnada · mäkká návnada · měkká návnada · mäkká návnada ·

CZ RATIMOR MĚKKÁ NÁVNADA

POKYNY PRO UMÍSTĚNÍ A NÁVOD K POUŽITÍ: Návnahu umístěte na místa, kde se objevují stopy výskytu hlodavců, jako je čerstvý trus uvnitř budov nebo v těsnosti hrází a nor, ostatních nebo míst, kam hlodavci chodí žrát. Rozmístěte návnahu vlude po zamřelené oblasti. Obecně je množením účinnější použít větší počet menších dávek návnahy než menší počet větších dávek návnahy. Velké dávky návnahy zvyšují riziko pro divoce žijící zvířata a živočichy, proti kterým není určena.

Dávkování: ▸ **Pro potkany a krysy** (Rattus norvegicus) jako dávku použijte návnahu do 200 g. Dávky návnahy rozmístěte ve vzdálenosti 10 m, při velkém výskytu hlodavců (přemnožení) vzdálenost zmenšete na 5 m. S dávkami návnahy po rozmístění několik dní nehýbejte a nepřemísťujte je. Jestliže po 7–10 dnech na návnahu nezjistíte žádné známky aktivity hlodavců, přemístěte návnahu do oblastí s větší aktivitou.

▸ **Pro myši** (Mus musculus) jako dávku použijte návnahu do 40 g. Dávky návnahy rozmístěte ve vzdálenosti 5 m, při velkém výskytu hlodavců (přemnožení) vzdálenost zmenšete na 2 m. Myši jsou velmi zvědavé, proto v procesu hubení může pomoci, když návnahy každé 2–3 dni při kontrole nebo doplňování přemístíte.

Návnahu chraňte před zvířaty, proti kterým není určena, a před vodou nejlépe použitím jedových stanic, jež jsou na trhu. Jestliže je nemáte k dispozici, umístěte návnahu na tácky pro návnahu a do otvorů odpadních rour nebo pod kusy střešních tašek, desek nebo vhodného pláště, které jsou otáčivě opřeny o stěnu a vhodně zatíženy tak, aby byl přístup k návnaze znevažován (zdálení dětem, ptákům a zvířatům, proti kterým není určena. V prvních 10–14 dnech často kontrolujte místa s návnahou a doplňte návnahu, kterou snědli hlodavci, pochodlá voda nebo znečistěla špína. Jestliže na určitých místech byla snězena všechna návnaha, zvětšete množství návnahy tak, že zvýšíte počet míst s návnahou. Nezvětšujte velikost dávek návnahy. Stejně jako u všech antikoagulantních rodenticidů hlodavci obvykle trpeve po několika dnech po požití návnahy, obvykle po 4–10 dnech. Pro nepovolané použití: Při použití proti krysám a potkanům musí být použity kamenné dostupné deratizační stanice. Při použití proti myším lze použít deratizační stanice nebo návnahu umístit do zásobníků na chráněných místech. Zajistěte návnahu tak, aby ji nebylo možné odtáhnout. **MECHANISMUS ÚČINKU:** Bromadiolon zabraňuje tvorbě protrombinu v krvi, což způsobuje krvácení a úhyn hlodavce. Úhyn jednotlivých hlodavců nemá vliv na odstranění vůči návnahám živých hlodavců. Je účinný také proti hlodavcům, kteří jsou odolní proti antikoagulantním rodenticidům první generace. **BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PODMÍNKY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ:** Přípravek se nesmí používat na místech, kde může dojít ke kontaktu s povrchem potravin nebo krmiv, kuchyňského nářadí či jejich kontaminaci. Vyhýbejte se jakémukoliv styku s ústy. Před jídlem a po použití si umyjte ruce a zasaženou pokožku. Návnahy musí být bezpečně uzamčeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití návnahy jinými zvířaty nebo dětmi. Pokud je to možné, návnahu musí být zajištěna proti jejímu odtažení mimo místa aplikace. V pravidelných intervalech kontrolujte a odstraňujte uhynulé hlodavce, abyste tak čelila, jak kontrolujete a/nebo doplňujete návnahu. Uhynulé hlodavce odstraňujte v souladu s místními předpisy. Pokud se používají bezpečnostní jedové stanice, tyto musí být jasně označeny, že obsahují rodenticidy a že se s nimi nemá hýbat. Nepoužívejte rodenticidy s obsahem antikoagulantu jako trvalé návnahy. Pokud se výrobek používá na veřejně přístupných místech, tato místa musí být v průběhu procesu likvidace hlodavců označena a u návnah musí být také označení, které upozorňuje na nízká primární a sekundární otravy antikoagulantem a popisuje první pomoc v případě otravy. **PŘÍZNAKY OTRAVY:** Bromadiolon je antikoagulant, jenž způsobuje krvácení, to ve může objevit i několik dní po kontaktu. **POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:** V případě požití nebo při pochybnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je to možné, ukažte etiketu). Při styku s pokožkou odstraňte znečištěné oblečení. Pokožku omyjte vodou a mýdlem. Pokud jsou zasaženy oči, důkladně je vymyjte velkým množstvím čisté vody. Při požití nepředávejte vyhledejte pomoc lékaře a ukažte mu tento obal nebo etiketu. **PROTILÁTKA:** Vitamin K1 (podléhá lékařským doporučení). **SKLADOVÁNÍ:** Výrobek skladujte v originálním obalu, které zavřený a na bezpečném místě. Skladujte na suchém, chladném a větraném místě. **BEZPEČNÁ LIKVIDACE NEPOUŽITÉHO PROSTŘEDKU A JEHO OBALU:** Po použití odstraňte všechny náhrabky a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy. Odpadní obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy. **OBSAH:** 25 kg. **DATUM VÝROBY, SKLADOVATELNOST A ČÍSLO ŠARŽE:** na obalu.

RODENTICID k hubení potkanů, krys a myší uvnitř a vně budov za účelem ochrany veřejného zdraví, antikoagulantní produkt s retardací.
Účinná látka: bromadiolon 0,05 g/kg (CAS: 28772-56-7)
Formulace: Návnaha ve formě pasty s obsahem účinné látky k přímému použití. **Upozornění:** Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte ochranné rukavice. PŘI POUŽITÍ: Okamžitě volejte KOORDINAČNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.
Určeno pro profesionální použití. Zabraňte dětem, ptákům a necílovým organismům (především psům, kočkám, pravotům a drůbeži), v přístupu k návnaze. Číslo povolení: CO-2013-0014.
VÝROBCE A DRŽITEL POVOLENÍ: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI-1360 Vrhnika, Slavinija, www.unichem.si, Tel: +386 1 7558 152, e-mail: unichem@unichem.si
DOVOZCE: Unichem Agro CZ s.r.o., Ke Kaučce 2, 15000 Praha 5, Česká Republika, Tel.: + 420 724565724



DOTISK 15x25

5 kg

SK RATIMOR MÄKKÁ NÁVNADA

Návod na použitie Návnadu umiestnil na miesta výskytu hlodavcov, na miesta kde je viditeľný výskyt hlodavcov, čerstvý trus, v blízkosti hnízd a nor kde sa hlodavce kŕmia. Umiestnite návnady v celej napadnutej oblasti.

Odporúčané množstvá použitia: ▸ Pri napadnutí **potkanmi** (R. norvegicus) použil návnadu miestami v množstve 200 g. Bodovo rozdeľ 10 m od seba, v prípade veľkého výskytu hlodavcov na 5m. Návnahu nepremiešajte ani s ňou nemanipulujte niekoľko dní po dušení. V prípade, že po 7–10 dňoch nie sú priamo výskytu hlodavcov, návnadu presuňte na miesta väčšieho pohybu hlodavcov.

▸ Pri napadnutí **myšami** (M. musculus) použil návnadu miestami do 40 g. Bodovo umiestnil na 5 m od seba, zvýšil vzdialenosť až na 2 metre pri veľkom zamorení. Myši sú veľmi zvedavé, a pomôže celému procesu presunúť raz za 2–3 dni návnadu na iné miesta, ak sú viditeľné príznaky kontaktu s návnadou. Miesta s návnadou chráňte pred deťmi, mocnejšou skupinou zvierat a kontaminovaných vodných zdrojov. Najvhodnejšie je použitie kovových návnahových staníčok. Ak nie sú k dispozícii, umiestnite návnadu do vnútra drevěného potrubia, pod kusy brídlice, dosiek alebo časti vhodného plechu, zabránil prístupu k návnade deťom, vtákom a necieľovej skupine zvierat. V pravidelných intervaloch kontrolovať miesta s návnadou. Doplňať návnadu, ktorú bola zjedená poprípade ak bola znehodnotená počasím, alebo znečistená špinou. Zvýšte počet miest s návnadou na miestach kde návnada bola úplne zjedená. Nezvyšujte ale množstvo dávku na miesta. Ako pri všetkých antikoagulantných rodenticídnych prípravkoch, hlodavec uhynie a niekoľko dní po požití návnady, v priemere 4–10 dní. **Účinok:** Bromadiolon zabraňuje zrážaniu krvi, spôsobuje vnútorné krvácanie a následne smrť hlodavca. Prejavuje sa pomalý a krátky dobe po požití. Uhynutie jedného z hlodavcov nemá vplyv na účinok návnady na ostatné hlodavce, ktoré sú stále nalive. Je účinný na hlodavce, ktoré sú majú odolnosť na WARFARÍN a iné antikoagulanty prvej generácie. **Bezpečnostné opatrenia a podmienky pre bezpečné použitie:** Zabráňte kontaminácii ústnej dutiny. Pred jedením a po použití prípravku dôkladne umyť ruky a odkryté miesta na koži. Návnada musí byť uskladnená na bezpečnom mieste, zabránil použitiu návnady deťmi a inými necieľovými zvieratami. Ak je to možné zabezpečte návnadu proti odvlečeniu. V pravidelných intervaloch kontrolujeme a zbierame uhynuté hlodavce, aspoň v tej ustej frekvencii ako doplňujeme a meníme návnadu. Uhynuté hlodavce likvidujeme podľa príslušných zákonov. Ak používame staničky musí by byť zreteľné označené o obsahu rodenticídom a ďalšie informácie o tom, že sa nemá s nimi manipulovať. Pri používaní produktu na verejných miestach, miesta musí byť označené tabuľkami s upozornením a možnosti primárnej a sekundárnej otravy antikoagulantami, ďalej o použití prvej pomoci pri prípadnej otrave. Prípravok obsahuje hořčí činidlo denatoniom benzoate, BITREX, ktoré pôsobí ako chuťový odpudzovač pre človeka. **Príznaky otravy:** Bromadiolon je antikoagulant, ktorý môže spôsobiť krvácanie, ktoré sa objaví aj o niekoľko dní po použití. **Prvá pomoc pri požití:** Pri nedorozumení požil alebo pri pôznaných nevoľnostiach vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte mu etiketu. **Protijed:** Vitamín K1 (aplikovaný podlekárskym dozorom). Liečbu používajte je možné konzultovať s toxikologickým informačným centrom: Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel: 00421 2 54 77 41 66, fax: 00421 2 54 77 46 05. **Skladovanie:** Skladujte v originálnom balení, uzavreté na bezpečnom mieste. Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. **Bezpečnosť pri likvidácii nepoužitého prostriedku a obalu:** Odstráňte všetky nepoužité návnady a zlikvidujte podľa miestnych zákonov. Prázdne obaly likvidovať podľa miestnych predpisov. **Obsah:** 25 kg.
Dátum výroby, dátum spotreby a číslo šarže: na obale. **»Používajte biocídne výrobky bezpečne«**

RODENTICÍD pre kontrolu potkanov a myší v kanalizácii, interiéry a exteriéry v okolí budov.
Aktívna látka: bromadiolón 0.05 g/kg (CAS na.: 28772-56-7)
Formulácia: mäkká návnada, na okamžité použitie (RB). Len na profesionálne použitie. **Upozornenie:** Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Noste ochranné rukavice. PO POUŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/ oblastnými/ národnými/medzinárodnými nariadeniami. **Zabráňte nebezpečenstvu kontaminácie človeka a životného prostredia, riadte sa pokynmi v návode na použitie. Zabráňte prístupu** k návnahe deťom, vtákom a zvieratám pre ktoré táto návnada nie je určená (psy, mačky, ošípané a hydinu).
Číslo registrácie: 2011/2249/11696/SK/MA/19234. **Výrobca a držiteľ registrácie:** Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI-1360 Vrhnika, Slovenia, www.unichem.si, tel: +386 1 7558 152, email: unichem@unichem.si
Dovozca: Unichem Slovakia s.r.o., Bratislava, Obežná 71, Tel: + 21911221311

· měkká návnada · mäkká návnada · měkká návnada · mäkká návnada ·

CZ RATIMOR MĚKKÁ NÁVNADA

POKYNY PRO UMÍSTĚNÍ A NÁVOD K POUŽITÍ: Návnahu umístěte na místa, kde se objevují stopy výskytu hlodavců, jako je čerstvý trus uvnitř budov nebo v těsnosti hrází a nor, ostatních nebo míst, kam hlodavci chodí žrát. Rozmístěte návnahu vlude po zamřelené oblasti. Obecně je množením účinnější použít větší počet menších dávek návnahy než menší počet větších dávek návnahy. Velké dávky návnahy zvyšují riziko pro divoce žijící zvířata a živočichy, proti kterým není určena.

Dávkování: ▸ Pro potkany a krysy (Rattus norvegicus) jako dávku použijte návnahu do 200 g. Dávky návnahy rozmístěte ve vzdálenosti 10 m, při velkém výskytu hlodavců (přemnožení) vzdálenost zmenšete na 5 m. S dávkami návnahy po rozmístění několik dní nehýbejte a nepřemísťujte je. Jestliže po 7–10 dnech na návnahu nezjistíte žádné známky aktivity hlodavců, přemístěte návnahu do oblastí s větší aktivitou.

▸ Pro myši (Mus musculus) jako dávku použijte návnahu do 40 g. Dávky návnahy rozmístěte ve vzdálenosti 5 m, při velkém výskytu hlodavců (přemnožení) vzdálenost zmenšete na 2 m. Myši jsou velmi zvědavé, proto v procesu hubení může pomoci, když návnahy každé 2–3 dni při kontrole nebo doplňování přemístíte.

Návnahu chraňte před zvířaty, proti kterým není určena, a před vodou nejlépe použitím jedových stanic, jež jsou na trhu. Jestliže je nemáte k dispozici, umístěte návnahu na tácky pro návnahu a do otvorů odpadních rour nebo pod kusy střešních tašek, desek nebo vhodného pláště, které jsou otáčivě opřeny o stěnu a vhodně zatíženy tak, aby byl přístup k návnaze znevažován (zdálení dětem, ptákům a zvířatům, proti kterým není určena. V prvních 10–14 dnech často kontrolujte místa s návnahou a doplňte návnahu, kterou snědli hlodavci, pochodlá voda nebo znečistěla špína. Jestliže na určitých místech byla snězena všechna návnaha, zvětšete množství návnahy tak, že zvýšíte počet míst s návnahou. Nezvětšujte velikost dávek návnahy. Stejně jako u všech antikoagulantních rodenticídů hlodavci obvykle trpeve po několika dnech po požití návnahy, obvykle po 4–10 dnech. Pro nepovolané použití: Při použití proti krysám a potkanům musí být použity kamenné dostupné deratizační stanice. Při použití proti myším lze použít deratizační stanice nebo návnahu umístit do zásobníků na chráněných místech. Zajistěte návnahu tak, aby ji nebylo možné odtáhnout. MECHANISMUS ÚČINKU: Bromadiolon zabraňuje tvorbě protrombinu v krvi, což způsobuje krvácení a úhyn hlodavce. Úhyn jednotlivých hlodavců nemá vliv na odstranění vůči návnahám živých hlodavců. Je účinný také proti hlodavcům, kteří jsou odolní proti antikoagulantním rodenticídům první generace. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PODMÍNKY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ: Přípravek se nesmí používat na místech, kde může dojít ke kontaktu s povrchem potravin nebo krmiv, kuchyňského nářadí či jejich kontaminaci. Vyhýbejte se jakémukoliv styku s ústy. Před jídlem a po použití si umyjte ruce a zasaženou pokožku. Návnahy musí být bezpečně uzamčeny tak, aby se minimalizovalo riziko požití návnahy jinými zvířaty nebo dětmi. Pokud je to možné, návnahu musí být zajištěna proti jejímu odtažení mimo místa aplikace. V pravidelných intervalech kontrolujte a odstraňujte uhynulé hlodavce, abyste tak čelila, jak kontrolujete a/nebo doplňujete návnahu. Uhynulé hlodavce odstraňujte v souladu s místními předpisy. Pokud se používají bezpečnostní jedové stanice, tyto musí být jasně označeny, že obsahují rodenticidy a že se s nimi nemá hýbat. Nepoužívejte rodenticidy s obsahem antikoagulantu jako trvalé návnahy. Pokud se výrobek používá na veřejně přístupných místech, tato místa musí být v průběhu procesu likvidace hlodavců označena a u návnah musí být také označení, které upozorňuje na nízká primární a sekundární otravy antikoagulantem a popisuje první pomoc v případě otravy. PŘÍZNAKY OTRAVY: Bromadiolon je antikoagulant, jenž způsobuje krvácení, to ve může objevit i několik dní po kontaktu. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: V případě požití nebo při pochybnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je to možné, ukažte etiketu). Při styku s pokožkou odstraňte znečištěné oblečení. Pokožku omyjte vodou a mýdlem. Pokud jsou zasaženy oči, důkladně je vymyjte velkým množstvím čisté vody. Při požití nepředávejte vyhledejte pomoc lékaře a ukažte mu tento obal nebo etiketu. PROTILÁTKA: Vitamin K1 (podléhá lékařským doporučení). SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v originálním obalu, které zavřený a na bezpečném místě. Skladujte na suchém, chladném a větraném místě. BEZPEČNÁ LIKVIDACE NEPOUŽITÉHO PROSTŘEDKU A JEHO OBALU: Po použití odstraňte všechny náhrabky a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy. Odpadní obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy. OBSAH: 25 kg. DATUM VÝROBY, SKLADOVATELNOST A ČÍSLO ŠARŽE: na obale.

RODENTICID k hubení potkanů, krys a myší uvnitř a vně budov za účelem ochrany veřejného zdraví, antikoagulantní produkt s retardací.
Účinná látka: bromadiolon 0,05 g/kg (CAS: 28772-56-7)
Formulace: Návnaha ve formě pasty s obsahem účinné látky k přímému použití. Upozornění: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladovat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte ochranné rukavice. PŘI POUŽITÍ: Okamžitě volejte KOORDINAČNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.
Určeno pro profesionální použití. Zabraňte dětem, ptákům a necílovým organismům (především psům, kočkám, pravotům a drůbeži), v přístupu k návnaze. Číslo povolení: CO-2013-0014.
VÝROBCE A DRŽITEL POVOLENÍ: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI-1360 Vrhnika, Slavinija, www.unichem.si, Tel: +386 1 7558 152, e-mail: unichem@unichem.si
DOVOZCE: Unichem Agro CZ s.r.o., Ke Kaučce 2, 15000 Praha 5, Česká Republika, Tel.: + 420 724565724

DOTISK 15x25

5 kg

SK RATIMOR MÄKKÁ NÁVNADA

Návod na použitie Návnadu umiestnil na miesta výskytu hlodavcov, na miesta kde je viditeľný výskyt hlodavcov, čerstvý trus, v blízkosti hnízd a nor kde sa hlodavce kŕmia. Umiestnite návnady v celej napadnutej oblasti.

Odporúčané množstvá použitia: ▸ Pri napadnutí potkanmi (R. norvegicus) použil návnadu miestami v množstve 200 g. Bodovo rozdeľ 10 m od seba, v prípade veľkého výskytu hlodavcov na 5m. Návnahu nepremiešajte ani s ňou nemanipulujte niekoľko dní po dušení. V prípade, že po 7–10 dňoch nie sú priamo výskytu hlodavcov, návnadu presuňte na miesta väčšieho pohybu hlodavcov.

▸ Pri napadnutí myšami (M. musculus) použil návnadu miestami do 40 g. Bodovo umiestnil na 5 m od seba, zvýšil vzdialenosť až na 2 metre pri veľkom zamorení. Myši sú veľmi zvedavé, a pomôže celému procesu presunúť raz za 2–3 dni návnadu na iné miesta, ak sú viditeľné príznaky kontaktu s návnadou. Miesta s návnadou chráňte pred deťmi, mocnejšou skupinou zvierat a kontaminovaných vodných zdrojov. Najvhodnejšie je použitie kovových návnahových staníčok. Ak nie sú k dispozícii, umiestnite návnadu do vnútra drevěného potrubia, pod kusy brídlice, dosiek alebo časti vhodného plechu, zabránil prístupu k návnade deťom, vtákom a necieľovej skupine zvierat. V pravidelných intervaloch kontrolovať miesta s návnadou. Doplňať návnadu, ktorú bola zjedená poprípade ak bola znehodnotená počasím, alebo znečistená špinou. Zvýšte počet miest s návnadou na miestach kde návnada bola úplne zjedená. Nezvyšujte ale množstvo dávku na miesta. Ako pri všetkých antikoagulantných rodenticídnych prípravkoch, hlodavec uhynie a niekoľko dní po požití návnady, v priemere 4–10 dní. Účinok: Bromadiolon zabraňuje zrážaniu krvi, spôsobuje vnútorné krvácanie a následne smrť hlodavca. Prejavuje sa pomalý a krátky dobe po požití. Uhynutie jedného z hlodavcov nemá vplyv na účinok návnady na ostatné hlodavce, ktoré sú stále nalive. Je účinný na hlodavce, ktoré sú majú odolnosť na WARFARÍN a iné antikoagulanty prvej generácie. Bezpečnostné opatrenia a podmienky pre bezpečné použitie: Zabráňte kontaminácii ústnej dutiny. Pred jedením a po použití prípravku dôkladne umyť ruky a odkryté miesta na koži. Návnada musí byť uskladnená na bezpečnom mieste, zabránil použitiu návnady deťmi a inými necieľovými zvieratami. Ak je to možné zabezpečte návnadu proti odvlečeniu. V pravidelných intervaloch kontrolujeme a zbierame uhynuté hlodavce, aspoň v tej ustej frekvencii ako doplňujeme a meníme návnadu. Uhynuté hlodavce likvidujeme podľa príslušných zákonov. Ak používame staničky musí by byť zreteľné označené o obsahu rodenticídom a ďalšie informácie o tom, že sa nemá s nimi manipulovať. Pri používaní produktu na verejných miestach, miesta musí byť označené tabuľkami s upozornením a možnosti primárnej a sekundárnej otravy antikoagulantami, ďalej o použití prvej pomoci pri prípadnej otrave. Prípravok obsahuje hořčí činidlo denatoniom benzoate, BITREX, ktoré pôsobí ako chuťový odpudzovač pre človeka. Príznaky otravy: Bromadiolon je antikoagulant, ktorý môže spôsobiť krvácanie, ktoré sa objaví aj o niekoľko dní po použití. Prvá pomoc pri požití: Pri nedorozumení požil alebo pri pôznaných nevoľnostiach vyhľadajte ihneď lekársku pomoc a ukážte mu etiketu. Protijed: Vitamín K1 (aplikovaný podlekárskym dozorom). Liečbu používajte je možné konzultovať s toxikologickým informačným centrom: Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel: 00421 2 54 77 41 66, fax: 00421 2 54 77 46 05. Skladovanie: Skladujte v originálnom balení, uzavreté na bezpečnom mieste. Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Bezpečnosť pri likvidácii nepoužitého prostriedku a obalu: Odstráňte všetky nepoužité návnady a zlikvidujte podľa miestnych zákonov. Prázdne obaly likvidovať podľa miestnych predpisov. Obsah: 25 kg.
Dátum výroby, dátum spotreby a číslo šarže: na obale. »Používajte biocídne výrobky bezpečne«

RODENTICÍD pre kontrolu potkanov a myší v kanalizácii, interiéry a exteriéry v okolí budov.
Aktívna látka: bromadiolón 0.05 g/kg (CAS na.: 28772-56-7)
Formulácia: mäkká návnada, na okamžité použitie (RB). Len na profesionálne použitie. Upozornenie: Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Noste ochranné rukavice. PO POUŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/ oblastnými/ národnými/medzinárodnými nariadeniami. Zabráňte nebezpečenstvu kontaminácie človeka a životného prostredia, riadte sa pokynmi v návode na použitie. Zabráňte prístupu k návnahe deťom, vtákom a zvieratám pre ktoré táto návnada nie je určená (psy, mačky, ošípané a hydinu).
Číslo registrácie: 2011/2249/11696/SK/MA/19234. Výrobca a držiteľ registrácie: Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, SI-1360 Vrhnika, Slovenia, www.unichem.si, tel: +386 1 7558 152, email: unichem@unichem.si
Dovozca: Unichem Slovakia s.r.o., Bratislava, Obežná 71, Tel: + 21911221311