

K-Othrine® 25 SC

Stabilizovaná vodná suspenzia insekticídneho prípravku pre profesionálne použitie určeného na ničenie škodlivého a obtiažneho hmyzu v bytoch, obchodoch, zdravotníckych zariadeniach, potravinárskych prevádzkach a výrobniciach, v objektoch živočíšnej výroby a pod.

Účinná látka: deltamethrin 25 g/l



Výstražné slovo: POZOR

Prípravok obsahuje nebezpečnú látku deltamethrin (EC 258-256-6).

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Držiteľ registrácie: Bayer s.r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5, ČR, tel. 00420 266101111.

Vyrába: Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie-Laclair, 69009, Lyon, Francúzsko

Registračné číslo CCHLP: bio271/D03/7/CCHLP

K-Othrine® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer.

Bezpečnostné opatrenia

Pri práci používajte ochranný pracovný odev EN 13034-A1 (typ 6), ochranné okuliare EN 166, gumové alebo plastové rukavice označené piktogramom proti chemickému nebezpečenstvu EN 420+A1 s uvedeným kódom podľa prílohy A k EN 374-1, gumenú obuv.

Pri práci nejedzte, nefajčite a nepite. Po práci si dôkladne umyte ruky a tvár teplou vodou a mydlom. Postrek vykonávajte bez prítomnosti ďalších osôb. Vstup do ošetrovaných priestorov je možný po zaschnutí a vyvetraní. Z ošetrovaných objektov odstráňte nebalené potravinárske suroviny a výrobky. Balené v mieste postreku zakryte. Zakryte akvária. Pracovné stoly, stroje, nádoby pred zásahom prikryte a po vykonanej asanácii riadne vymyte. V objektoch živočíšnej výroby je nutné sa vyvarovať priamych zásahov hospodárskych zvierat pri postreku. Je zakázané ošetrovať krmivá a zdroje pitnej vody. Po aplikácii je nutné umyť žľaby, napájačky a plochy na uloženie krmiva.

Prípravok je horľavinou. Pokiaľ sa dostane do ohniska požiaru zabezpečte, aby kontaminovaná voda z hasenia nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia a najmä, aby nemohla preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd.

Karta bezpečnostných údajov je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.

Návod na použitie

Spôsob účinku: Pôsobí ako kontaktný insekticíd vo veľmi krátkej dobe a má dlhú reziduálnu účinnosť (v závislosti na ošetrovanom druhu povrchu a použitej koncentrácii 6 – 8 týždňov). Účinná látka sa neodparuje. Je odolná voči pôsobeniu svetla a tepla, je bez zápachu a nezanecháva viditeľné stopy na ošetrovaných plochách a nepôsobí korozívne. Prípravok má dráždivý účinok na hmyz.

Spektrum účinnosti: Ničí dospelé a larválne štádia hmyzu. Používajte na ničenie rusov domových, švábov obyčajných, cvrčkov domácich, pavšív, ôs, múch, mravcov, rôznych skladiskových chrobákov, molí, komárov, bích i švehel a iných druhov hmyzu v uzavretých objektoch.

Zmiešaním prípravku s vodou a po dôkladnom zamiešaní vzniká suspenzia, ktorú aplikujte pomocou ručných alebo motorových postrekovačov. Nádobu s prípravkom dôkladne pretrepte, aby ste homogenizovali jej obsah. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže aplikačného prístroja, vopred naplneného 2/3 vypočítaného množstva vody. Za stáleho miešania doplňte nádrž na celkový objem a môžete vykonať aplikáciu. Počas aplikácie musí byť zabezpečené miešanie postrekovej suspenzie.

Dávkovanie

Na ošetrovanie porózných povrchov (stien, dreva, betónu a pod.) používajte 5 ml prípravku/ 995 ml vody a aplikujte v dávke jeden liter suspenzie na cca 10 m² ošetrovaného povrchu.

Na ošetrovanie neporéznych povrchov používajte 10 ml prípravku/990 ml vody a aplikujte v dávke jeden liter suspenzie na cca 20 m² ošetrovaného povrchu.

Vykonávajte celoplošný alebo pásový (bariérový) postrek. Pri likvidácii švábovitého hmyzu vykonávajte pásový postrek okolo všetkých vstupov do miestnosti, pozdĺž stien, okolo výleviek a umývadiel, dresov, vaní, chladničiek, rozvodov vody a tepla. Proti plošticiam aplikujte suspenziu do konštrukcií postelí, nábytku, za obrazy a pod. Proti blchám ošetríte celoplošne podlahy (najmä drevené), koberce, pásy pozdĺž stien a miesta, kde sa zdržujú domáce zvieratá. Proti muchám a komárom, moliam a vijačkám vykonávajte spravidla celoplošné postrekovanie stien a zvýšenú pozornosť venujte miestam, kde sa zhromažďujú (komáre na stropoch, muchy na oslnených stenách a pod.). Postrek opakujte podľa potreby v závislosti na druhu hmyzu a početnosti výskytu.

Prvá pomoc

Po požití: Vypláchnite ústa vodou a podajte malé množstvo vody k napitiu. Nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Po nadýchaní: prerušte expozíciu, u postihnutého zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom pitnej vody najmenej 15 minút (po 5 minútach odstráňte kontaktné šošovky pokiaľ sú používané). Ak podráždenie pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev a pokožku umyte teplou vodou a mydlom (min. 15 minút). Aplikujte krém s vitamínom E. Ak podráždenie pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.

Liečbu postihnutého môže lekár konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel. č. 02/54774166.

Skladovanie

Prípravok skladujte pri teplotách 5 - 30°C v originálnych neporušených obaloch v suchých, uzatvorených a dobre vetrateľných skladoch, oddelene od potravín a krmív, hnojív, liekov a dezinfekčných prípravkov a prázdnych obalov od týchto látok. Nariedenú suspenziu neskladujte !

Pri dodržaní podmienok skladovania je skladovacia doba 2 roky od dátumu výroby.

Zneškodnenie obalov

Prázdne obaly od prípravku po dôkladnom vypláchnutí (aspoň 2x vodou) a znehodnotenú spálte vo chválenej spaľovni. Oplachové vody použite na prípravu postrekovej kvapaliny. Prípadné zvyšky prípravku po nasiaknutí do horľavého materiálu (piliny) spálte rovnako vo schválenej spaľovni.

Dátum výroby a číslo šarže: uvedené na obale

Balenie: 1 l (PE fľaša)